


Conduite à tenir en milieu de travail

Si un salarié est diagnostiqué positif

→ Eviction du salarié

Puis :

- **Rechercher les tousseurs** autour du cas dans les délais compatible avec la durée d'incubation
- Repérer les **sujets contacts** dans la période de contagion
- **Informier** l'ensemble du personnel
- Prévenir **Santra Plus**
- Se référer aux **protocoles internes** (notamment en milieu de soins)
- Respecter les **règles d'hygiène et aérer** les espaces
- Mettre à disposition et inciter les collaborateurs à utiliser des **EPI** adaptés (masque chirurgical en cas de toux)



Quelle prévention ?

La vaccination DTPC : Tétanos Polio

diphthérie Coqueluche

Le meilleur moyen de prévention est le vaccin. Il existe des vaccins pour les nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes.



L'immunité n'est pas permanente

Il est possible de contracter la coqueluche plusieurs fois dans sa vie, même vacciné. En effet, pour une protection efficace, il faut réaliser les rappels de vaccin.



LA COQUELUCHE

Contactez-nous



02 32 74 94 94



3 rue des Sports
76700 Gonfreville L'Orcher



www.santraplus.fr




Santra Plus
Prévention • Santé • Travail

La coqueluche, qu'est ce que c'est ?

- Infection respiratoire due à une bactérie appelée Bordetella pertussis ou Bordetella parapertussis
- Elle est très contagieuse et se transmet par la toux
- Elle provoque des quintes de toux fréquentes qui peuvent durer plusieurs semaines

Qui atteint elle ?

- Infection sévère pour l'ensemble de la population
- Peut-être mortelle pour les personnes fragiles , les nourrissons, les femmes enceinte et les personnes âgées.



Comment se transmet elle ?

- Contamination par voie aérienne à travers les gouttelettes de salive projetées par la toux
- Très contagieuse, une personne malade peut contaminer en moyenne 15 à 17 personnes
- La période d'incubation est en moyenne de 10 jours. contagiosité maximale la première semaine puis décroît mais peut persister 3 semaines.
- Le sujet n'est plus contagieux après 5 jours de traitement antibiotique efficace
- La coqueluche se développe par clusters



Quels sont les symptômes ?

Chez l'adulte, la coqueluche entraîne :

- Des accès de toux soudains, violents et répétés qui provoquent des spasmes
- Une respiration difficile et sifflante (chant du coq)
- Des crachats clairs et épais
- De la fièvre
- Un écoulement nasal (1 à 2 semaines)
- Des vomissements après les quintes de toux
- Un visage bouffi, rouge ou bleuté
- Des pétéchies : éclatement des vaisseaux des yeux
- Eternuement, toux persistante de plus de 7 jours

Plus intense la nuit

Quel traitement ?

Il est essentiel de confirmer la maladie par un examen biologique

La coqueluche se traite grâce aux antibiotiques
→ réduit la contagiosité en 5 jours

L'entourage proche doit aussi être traité (sauf si vaccin moins de 5 ans)

Conseils :

Repos, hydratation, repas légers, humidification de la pièce où séjourne la personne malade.